

































 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ En contacto o separadas &lt; 5 mm</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Abierta</li> <li>✓ Tensión neutra</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Continuo; sin masas, úlceras, cicatrices</li> <li>✓ No edemas ni hemorragia subcutánea</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Al nacer: 32-37 cm P ≥ 10 y &lt; 90</li> <li>✓ Mismo percentil que el peso</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Superficie lisa</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Simétricos</li> <li>✓ Movimientos conjugados</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Adecuado tamaño y armonía de las estructuras</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fácil de obtener</li> <li>✓ Se orienta y responde a la voz de los cuidadores</li> </ul>
SUTURAS CRANEALES	FONTANELAS	CUERO CABELLUDO	PERÍMETRO CEFÁLICO	BÓVEDA CRANEAL	OJOS Y MOVIMIENTOS OCULARES	CARA	SEGUIMIENTO VISUAL Y AUDITIVO
<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Cabalgamiento o cresta en las suturas</li> <li>✗ Forma anómala de la cabeza</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Abombada </li> <li>✗ Deprimida </li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Zona de alopecia. Signo del collar</li> <li>✗ Edema progresivo, rápido, hasta la base craneal y despega los pabellones auditivos </li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ P &lt; 3 y &gt; 97</li> <li>✗ Percentiles distintos para peso y perímetro cefálico</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Hundimiento </li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Asimetría pupilar</li> <li>✗ Sacudidas oculares</li> <li>✗ Movimientos no conjugados </li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Alteración de la forma, el tamaño o la armonía entre las partes</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Pobre orientación visual o auditiva</li> <li>✗ Fija, pero no atiende con la mirada</li> </ul> 
CRANEOSINOSTOSIS	HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL DESHIDRATACIÓN	ENCEFALOCELE, APLASIA CUTIS, TEJIDO CEREBRAL ECTÓPICO. HEMATOMA SUBGALEAR	MICRO/MACROCEFALIA. POBRE CRECIMIENTO DE LA CABEZA INTRAÚTERO/POSTNATAL	FRACTURA. RIESGO DE HEMORRAGIA INTRACRANEAL Y CONTUSIÓN CEREBRAL	AFECTACIÓN DEL III PAR CRANEAL. NISTAGMO/CONVULSIÓN. PARÁLISIS DE UN NERVIU O MÚSCULO OCULAR	ENFERMEDAD GENÉTICA O TERATOGÉNICA	NEUROCONDUCTA ALTERADA

 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Llanto/irritabilidad acorde a estímulo</li> <li>✓ Se consuela fácilmente</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ante estímulos capaz de despertar y mantener la vigilia durante largos segundos</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rítmica y eficaz</li> <li>✓ Capaz de alimentarse por boca</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Postura flexora en extremidades (cadera en 45 grados)</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Movimientos suaves y alternantes de extremidades</li> <li>✓ Variables en fuerza, intensidad y dirección</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sacudidas ocasionales ante estímulos</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Lisa y sin manchas cutáneas</li> </ul>
<p><b>CONSOLABILIDAD</b></p>	<p><b>CAPACIDAD PARA DESPERTAR Y MANTENER VIGILIA</b></p>	<p><b>SUCCIÓN Y ALIMENTACIÓN ORAL</b></p>	<p><b>POSTURA, TONO Y FUERZA</b></p>	<p><b>MOVIMIENTOS ESPONTÁNEOS</b></p>	<p><b>SACUDIDAS O SOBRESALTOS</b></p>	<p><b>PIEL</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Llanto o irritabilidad al menor estímulo</li> <li>✗ Difícil de consolar</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Dificultad para despertar ante estímulos de intensidad media o intensa</li> <li>✗ Cuando despierta mantiene la vigilia pocos segundos</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Succión débil, irregular o pobre coordinación succión-deglución</li> <li>✗ Alimentación oral ineficaz</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Hombros y/o caderas pegadas al plano de la cuna</li> <li>✗ Extremidades hiperextendidas</li> <li>✗ Cambio súbito en el tono muscular</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Rígid. Patrón extensor</li> <li>✗ Movimiento sincrónico de extremidades</li> <li>✗ Rítmicos y estereotipados; comienzo y final brusco</li> <li>✗ Ausencia de movimiento de una extremidad</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Sacudidas excesivas en número e intensidad al menor estímulo táctil o sonoro</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Manchas cutáneas diversas</li> <li>✗ Lesiones cutáneas en la línea media: apéndices, angioma, seno dérmico...</li> </ul> 
<p><b>IRRITABILIDAD EXTREMA. ABSTINENCIA O DOLOR</b></p>	<p><b>ENCEFALOPATÍA NEONATAL AGUDA</b></p>	<p><b>DISFUNCIÓN NEUROLÓGICA CENTRAL O PERIFÉRICA</b></p>	<p><b>HIPOTONÍA. DEBILIDAD MUSCULAR. DECORTICACIÓN O DESCERBRACIÓN</b></p>	<p><b>LESIÓN CEREBRAL. CONVULSIÓN. PLEXOPATÍA</b></p>	<p><b>HIPEREXITABILIDAD</b></p>	<p><b>ENFERMEDAD NEURO CUTÁNEA. DISRAFISMO ESPINAL OCULTO</b></p>