RIESGO DE TRANSMISIÓN DE SARS-CoV-2

Puérpera positiva para SARS-CoV-2 Intraútero Parto

¿Riesgo de defectos congénitos?

> Incertidumbre & estrés

Posible transmisión intraparto

Posibles cambios en los planes de parto

- Restricciones en el acompañamiento y en el contacto "piel con piel"
- Restricciones en el clampaje tardío del cordón

Neonato (transmisión horizontal en el hospital antes del alta o en casa)

Enfermedad Sin síntomas (distrés respiratorio, fiebre, otros...)

> Atención a las formas de transmisión (gotas, contacto, aerosol, fecal-oral)

ADMISIÓN

Es deseable que la toma de decisiones sea de forma individualizada y basada en el conocimiento científico disponible para reducir la angustia moral, y el impacto en el cuidado del recién nacido y su familia

Posibles cambios en la organización de las UCINs

- Políticas de distanciamiento social
 - o No sesiones clínicas / falta de tiempo de descanso
- Preocupaciones claves en los profesionales de la salud:
 - o Escasez de equipos de protección personal
 - o Dificultad para tomar decisiones en el triaje
 - Agotamiento físico y mental
 - Transferencia de la angustia moral sentida por otros colegas y miedo a infectarse

Posibles cambios en la atención centrada en la familia

- SARS-CoV-2 + = aislamiento de la madre / recién nacido
 - o Ausencia de amamantamiento
 - o Restricción en el contacto "piel con piel"
 - o No implicación de los padres en el cuidado del niño
- Restricciones para el resto de los recién nacidos ingresados
 - o Limitaciones en el contacto "piel con piel"
 - o Se prohíbe la entrada de ambos progenitores padres
 - o Se impide la visita de otros cuidadores

Angustia moral y agotamiento en trabajadores de la salud



Cambios en el vínculo padre & madre - recién nacido



Consecuencias para el resto de los recién nacidos admitidos y sus padres



Profesionales de la salud

POSIBLES ESTRATEGIAS

Familias

Reducir el estrés, preservar los cuidados centrados en la familia y obtener conocimiento y experiencia durante el brote

RESILIENCIA

- · Apoyo institucional (sobre todo para los profesionales en cuarentena)
 - · Comunicación efectiva
 - Turnos flexibles para recuperarse
 - Apoyo entre compañeros
- Formar parte de un desafío ético común

D **LIDERAZGO** · Cambios organizativos • Gestión de lo impredecible · Mostrar apoyo al equipo · Practicar la responsabilidad compartida • Crear un clima ético que admita diferentes puntos de vista • Estrategias para promover la "satisfacción por compasión" B

- **COMUNICACIÓN**
- Información con rigor y transparencia
- · Comunicación fluida
- Telemedicina para facilitar el contacto entre padres/familias

TRATAMIENTO & INVESTIGACIÓN

- Utilización de la telemedicina
- Investigación clínica cualitativa /cuantitativa
 - · Tratamientos actualizados
 - · Registro de base de datos

APOYO

- · Atención psicológica
- · Apoyo de los servicios sociales
- Continuación del cuidado después del alta

Arnaez J, Montes MT, Herranz-Rubia N and Garcia-Alix A (2020) The Impact of the Current SARS-CoV-2 Pandemic on Neonatal Care. Front. Pediatr. 8:247. doi: 10.3389/fped.2020.00247. Descargar en: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2020.00247/full